Información y preparación para
CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL PEDIÁTRICA

Atención: Debe tomar antibiótico 24 horas antes de realizarse el estudio, el día del estudio y un día después de realizado el estudio.

CEPOREXIN 250 mg. (jarabe):
Menos de 10 kg. de peso: 2.5 cc. cada 8 hs.
Más de 10 kg. de peso: 5 cc. cada 8 hs.
Si el niño está recibiendo otra medicación antibiótica como Profiláxis consulte con su médico para que se lo ajuste a dosis de tratamiento y en ese caso no debe recibir el Ceporexin.

DEBE TRAER:
- Urocultivo de no más de 7 días a la fecha en que se realizará el estudio
- Dos toallas
- Estudios previos

Ante cualquier duda consultar con el pediatra

EL DÍA DEL ESTUDIO DEBERÁ TRAER:
- Sachet de solución fisiológica por 500 ml. y un frasco ampolla de 50 ml. de TELEBRIX "C" o TRIYOSON C 50 ml. o IOPAMIRON 300, no iónico (Iopamidol), más una guía de suero.
- El paciente deberá venir con ropa (remera, camiseta, etc.) sin botones o clips.

Los niños deberán concurrir acompañados con dos adultos.
En caso de ser mujer que no esté embarazada.

PREPARACIÓN